

Eutipiose

A eutipiose é uma doença provocada por ascósporos que se desenvolvem em ramos/madeira morta. É uma doença muito destrutiva e que se espalha facilmente entre as vinhas, normalmente adultas ou já envelhecidas.

A precipitação auxilia a activação dos ascósporos e o vento transporta para distâncias que podem chegar aos 60 km. Os ascósporos penetram na videira através de feridas de poda.

Sintomas primários (locais onde se encontra o fungo):

- Tronco ou ramos afectados por uma necrose sectorial, de cor castanha clara e dura em forma de cunha (o ramo quebra facilmente)

Sintomas secundários (locais onde não se encontra o fungo):

- Lançamentos de crescimento reduzido e entre-nós curtos.
- Folhas de dimensão reduzida, deformadas e apresentam necroses na margem que provocam o fendilhamento. Nos casos mais graves as folhas secam e caem.
- Vegetação com aspecto de vassoura

Luta cultural:

- Executar a poda tarde e em tempo seco e sem vento
- Evitar grandes cortes
- Realizar despampas

Luta química:

- Desinfecção das feridas de poda com flusilazol carbendazima+fluzilazol
- Usar tesouras de poda com injeção do produto



Fig.34 Eutipiose no tronco



Fig.35 Eutipiose na folha

